


CARTA GEOMORFOLÓGICA

CARTA DE
PELIGROSIDAD GEOLOGICA

MENDOZA

3369-II

PROVINCIA DE MENDOZA
REPÚBLICA ARGENTINA



MORFOGÉNESIS FLUVIAL

- | | |
|---|--|
|  | <p>Abanicos aluviales proximales y Grandes abanicos aluviales</p> <p>1) del río Mendoza 1-a) Cono Maipú</p> <p>2) del Río San Juan</p> <p>3) del río Desaguadero</p> <p>4) del río Tunuyán</p> |
|  | Abanico con zonas de "salitrales" |
|  | Abanico con zonas compuestas por mantos de arena y salitrales asociados |
|  | Abanicos aluviales distales en Planicie Aluvial |
|  | Pedemontana - bajadas |
|  | Bajada con zona de "salitrales" |
|  | Áreas de huayquerías (bad lands) |
|  | Planicies aluviales |
|  | Terrazas fluviales |
|  | Principales paleocauces de Abanico Aluvial del río Mendoza |
|  | Valle fluvial con perfil transversal en garganta |

MORFOGÉNESIS EÓLICAS

- | | |
|---|--|
|  | Campos de médanos complejos (transversales + longitudinales) |
|  | "Mantos de arenas" (sand drifts="guadales") |
|  | Campos de médanos longitudinales compuestos |
|  | Campos de médanos barjanoides |
|  | Principales cubetas de deflación eólica |

MORFOGÉNESIS DE REMOCIÓN EN MASA

- ☐ Deslizamiento

FORMAS POLIGÉNICAS

- Niveles de pedimentación
 - "Montes islas"

MORFOGÉNESIS TECTÓNICA

-  Paisaje de bloque con acentuado control estructural (homoclinal y pliegues)
-  Escarpa de falla

FORMAS ANTRÓPICAS

- Zona modificada por acción antrópica.
A) zona de pseudokarst

HIDROGRAFÍA

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | Lagunas |
|  | Río permanente |
|  | Río efímero o intermitente |
|  | Playas Salinas - "Salitrales" |

La presente publicación se ajusta a la cartografía oficial, establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del IGM, - Ley 22.963 Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas ley Nº 24.224 de Ordenamiento Minero Edición preliminar Febrero de 1999

Escala: 1 : 250.000

AUTOR: María Alejandra González
Emilio F. González Díaz