

El presente informe se ha confeccionado para el Plan Fosforita, a requerimiento del Señor Jefe de la División Paleontología.

Perfil Bardas Blancas 1

Este perfil, levantado a plancheta, en escala 1:2000 por los Licenciados Francisco Nullo y Graciela B. de Nullo en cumplimiento de trabajos requeridos para el Plan Fosforita, se realizó en la región de Bardas Blancas (Prov. de Mendoza).

El perfil comienza con una porfirita de base, a la que se superponen niveles que corresponden a la Formación Remoredo, cuya edad es asignable a Triásico Superior (Keuper) por la presencia de plantas en otras localidades.

Desde la muestra 5704 hasta la 5725, los niveles presentan contenido faunístico determinable como:

M. 5713: Eudmetoceras (Euaptetoceras) sp.

M. 5718: Otoites sp.

Ludwigia sp.

Eudmetoceras (Euaptetoceras) sp.

Desde la muestra 5726 hasta el techo, se encuentra la Formación La Manga, datada hasta el presente como correspondiente a edades del Oxfordiano inferior, representada por las características calizas azules con Gryphaea, correlacionables asimismo con las de Sa. de Reyes.

El presente informe se ha confeccionado para el Plan Fosforita, a requerimiento del Señor Jefe de la División Paleontología.

Perfil Poti-Malal (sobre el Puesto de Gendarmería)

La búsqueda de material fosilífero, ha sido infructuosa en todos los niveles, La edad de los horizontes se ha determinado, con los datos de la geología de campo, proporcionados por el Lic. F. Nullo, y por correlación litológica, con el de Bardas Blancas 1, como Bayociano medio.

El presente informe se ha confeccionado para el Plan Fosforita, a requerimiento del Señor Jefe de la División Paleontología.

Perfil Bardas Blancas 1

Este perfil, levantado a plancheta, en escala 1:2000 por los Licenciados Francisco Nullo y Graciela B. de Nullo en cumplimiento de trabajos requeridos para el Plan Fosforita, se realizó en la región de Bardas Blancas (Prov. de Mendoza).

El perfil comienza con una porfirita de base, a la que se superponen niveles que corresponden a la Formación Remoredo, cuya edad es asignable a Triásico Superior (Keuper) por la presencia de plantas en otras localidades.

Desde la muestra 5704 hasta la 5725, los niveles presentan contenido faunístico determinable como:

M. 5713: Eudmetoceras (Euaptoceras) sp.

M. 5718: Otoites sp.

Ludwigia sp.

Eudmetoceras (Euaptoceras) sp.

Desde la muestra 5726 hasta el techo, se encuentra la Formación La Manga, datada hasta el presente como correspondiente a edades del Oxfordiano inferior, representada por las características calizas azules con Gryphaea, correlacionables asimismo con las de Sa. de Reyes.

El presente informe se ha confeccionado para el Plan Fosforita, a requerimiento del Señor Jefe de la División Paleontología.

Perfil Poti-Malal (sobre el Puesto de Gendarmería)

La búsqueda de material fosilífero, ha sido infructuosa en todos los niveles, La edad de los horizontes se ha determinado, con los datos de la geología de campo, proporcionados por el Lic. F. Nullo, y por correlación litológica, con el de Bardas Blancas 1, como Bayociano medio.

El presente informe se ha confeccionado para el Plan Fosforita, a requerimiento del Señor Jefe de la División Paleontología.

Perfil Poti-Malal (sobre el Puente de Gendarmería)

La búsqueda de material fosilífero, ha sido infructuosa en todos los niveles, La edad de los horizontes se ha determinado, con los datos de la geología de campo, proporcionados por el Lic. F. Nullo, y por correlación litológica, con el de Bardas Blancas 1, como Bayociano medio.