

EL PRESENTE INFORME SE CONFRECCIONO PARA EL PLAN FOSFORITA,  
A REQUERIMIENTO DEL SR. JEFE DE LA DIVISION PALEONTOLOGIA.

Los fósiles que se mencionaron más abajo, constituyen el contenido faunístico de los perfiles Rahueco 1 y 2, que fueron levantados en Neuquén, por los licenciatos Graciela B. de Nullo y Francisco Nullo, en escala 1:2000.

El primero de los perfiles cubre 230m de espesor real y los niveles en su mayoría son estériles o con restos de ammonites indeterminables. Los escasos niveles portadores de fauna marina poseen fauna del Caloviano medio-superior y Kimmeridgiano. El segundo de los perfiles de 270m de espesor real poseen, como el anterior, escasos niveles fosílicos que han proporcionado asimismo, edades similares al primer perfil.

Rahueco 1, de abajo arriba

HUESTRA N° 5505 estéril

5506	"
5507	"
5508	"
5509	"
5510	"
5511	"
5512	"
5513	"

- 2 -

MUESTRA N° 55<sup>14</sup> Estéril

55<sup>15</sup> "

55<sup>16</sup> "

55<sup>17</sup> "

55<sup>18</sup> "

55<sup>19</sup> "

5520 Nebrodites sp. aff. pressulus Leanza

Rahuecó 2, de arriba abajo

MUESTRA N° 55<sup>41</sup> - Yeso Auquilleo

55<sup>42</sup> Estéril

55<sup>43</sup> "

55<sup>44</sup> "

55<sup>45</sup> "

55<sup>46</sup> "

55<sup>47</sup> "

55<sup>48</sup> "

55<sup>49</sup> "

55<sup>50</sup> "

55<sup>51</sup> "

55<sup>52</sup> "

55<sup>53</sup> "

55<sup>54</sup> "

55<sup>55</sup> "

- 3 -

- MUESTRA N° 5556 Restos indeterminables  
5557 Estéril  
5558  
5559? Eurycephalites sp. Macrocephalites  
parvus Stehn, Eurycephalites  
surystoma (Stehn)  
5560 - ? Inoceramus sp.  
5561 restos indeterminables  
5562 estéril  
5563 "  
5564 restos indeterminables  
5565 " "  
5566 " "  
5567 estéril  
5568 "  
5569 "  
5570 "  
5571 Macrocephalites aff. parvus Stehn,  
Inoceramus galoi Boehm. Eurycepha-  
lites sp. aff. surystoma (Stehn)  
5573 Neuqueniceras steinmanni (Stehn)  
5574 Estéril  
5575 "  
5576 "

- 4 -

- MUESTRA N° 5577 restos indeterminables  
5578 estéril  
5579 "  
5580 restos indeterminables  
5581 Burvoenhalites curystoma (Stehn)  
5582 "  
5583 "  
5584 "  
5585 restos indeterminables  
5586 " "  
5587 estéril  
5588 "  
5589 "  
5590 "  
5591 "

### BIBLIOGRAFIA

- BURCKHARDT, C. 1912 - Faunes jurassiques et cretaques de San Pedro del Gallo - Bol. México Nº 29.
- LEANZA, A.F. 1947 - Descripción de la faúnala Kimmeridgiana de Neuquén, Informe preliminar Nº 62-Dirección de Minas y Geología.
- STEIN, E. 1923 - Contribuciones para el conocimiento del Batóniano y Caloviano en la América del Sur Neuen Jahrb. f. Mineralogie, etc. Beilage Band XLIX.
- STIPANICIC, P.N. 1969 - El avance en los conocimientos del jurásico argentino a partir de las esquemas de Groeber, Rev. Asoc. Geol. ARG. T. XXIV. Nº 4.-

EL PRESENTE INFORME SE CONFECCIONO PARA EL PLAN FOSFORITA,  
A REQUERIMIENTO DEL SR. JEFE DE LA DIVISION PALEONTOLOGIA.

Los fósiles que se mencionarán más abajo, constituyen el contenido faunístico de los perfiles Rahueco 1 y 2, que fueron levantados en Neuquén, por los licenciados Graciela B. de Nullo y Francisco Nullo, en escala 1:2000.

El primero de los perfiles cubre 230m de espesor real y los niveles en su mayoría son estériles o con restos de ammonites indeterminables. Los escasos niveles portadores de fauna marina poseen fauna del Caloviano medio-superior y Kimmeridgiano. El segundo de los perfiles de 270m de espesor real poseen, como el anterior, escasos niveles fosílicos que han proporcionado asimismo, edades similares al primer perfil.

Rahueco 1, de abajo arriba

MUESTRA Nº 5505 estéril

5506 "

5507 "

5508 "

5509 "

5510 "

5511 "

5512 "

5513 "

14 "

15 "

16 "

- 2 -

MUESTRA № 55 14 Estéril

55 15 "

55 16 "

55 17 "

55 18 "

55 19 "

Rimelidge 5520 Nebrodites sp. aff. pressulus Leanza

Rahueco 2, de arriba abajo

MUESTRA № 5541 - Yeso Auquileco

55 42 Estéril

55 43 "

55 44 "

55 45 "

55 46 "

55 47 "

55 48 "

55 49 "

55 50 "

55 51 "

55 52 "

55 53 "

55 54 "

55 55 "

- 3 -

- MUESTRA N° 5556 Restos indeterminables  
5557 Estéril  
5558  
Calvi-1/2 5559? Eurycephalites sp. Macrocephalites  
parvus Stehn, Eurycephalites  
curystoma (Stehn)  
5560 - ? Inoceramus sp.  
5561 restos indeterminables  
5562 estéril  
5563 "  
5564 restos indeterminables  
5565 " "  
5566 " "  
5567 estéril  
5568 "  
5569 "  
5570 "  
5571 Macrocephalites aff. parvus Stehn,  
Inoceramus galai Boehm, Eurycepha-  
lites sp. aff. curystoma(Stehn)  
5573 Neuqueniceras steinmanni (Stehn)  
5574 Estéril  
5575 "  
5576 "

- 4 -

- MUESTRA N° 5577 restos indeterminables  
5578 estéril  
5579 "  
5580 restos indeterminables  
5581 Euryceenthalites curvostoma (Stehn)  
5582 "  
5583 "  
5584 "  
5585 restos indeterminables  
5586 " "  
5587 estéril  
5588 "  
5589 "  
5590 "  
5591 "

BIBLIOGRAFIA

BURCKHARDT, C. 1912 - Faunes jurassiques et cretaques  
de San Pedro del Gallo - Bol. México N°  
29.

LEANZA, A.F. 1947 - Descripción de la faunala Kinmerid-  
giana de Neuquén, Informe preliminar N°  
62-Dirección de Minas y Geología.

STEHN, E. 1923 - Contribuciones para el conocimiento del  
Batoniano y Caloviano en la América del  
Sur Neuen jahrb. f. Mineralogie, etc. Bei-  
lage Band XLIX.

STIPANICIC, P.N. 1969 - El avance en los conocimientos del  
jurásico argentino a partir de las esque-  
mas de Groeber, Rev. Asoc. Geol. Arg.  
T. XXIV. N° 4.-

EL PRESENTE INFORME SE CONFECIONO PARA EL PLAN FOSFORITA,  
A REQUERIMIENTO DEL SR. JEFE DE LA DIVISION PALEONTOLOGIA.

Los fósiles que se mencionaron más abajo, constituyen el contenido faunístico de los perfiles Rahueco 1 y 2, que fueron levantados en Neuquén, por los licenciados Graciela B. de Nullo y Francisco Nullo, en escala 1:2000.

El primero de los perfiles cubre 230m de espesor real y los niveles en su mayoría son estériles o con restos de ammonites indeterminables. Los escasos niveles portadores de fauna marina poseen fauna del Caloviano medio-superior y Kimmeridgiano. El segundo de los perfiles de 270m de espesor real poseen, como el anterior, escasos niveles fosílicos que han proporcionado asimismo, edades similares al primer perfil.

Rahueco 1, de abajo arriba

MUESTRA №	5505	estéril
	5506	"
	5507	"
	5508	"
	5509	"
	5510	"
	5511	"
	5512	"
	5513	"
	14	"
	15	"
	16	"

- 2 -

MUESTRA N° 5514 Estéril

5515 "

5516 "

5517 "

5518 "

5519 "

5520 Nebroditessp.aff. pressulus Leanza

Rahueco 2, de arriba abajo

MUESTRA N° 5541 - Yeso Auquilco

5542 Estéril

5543 "

5544 "

5545 "

5546 "

5547 "

5548 "

5549 "

5550 "

5551 "

5552 "

5553 "

5554 "

5555 "

- MUESTRA Nº 5556 Restos indeterminables  
5557 Estéril  
5558  
5559? Eurycephalites sp. Macrocephalites  
parvus Stehn, Eurycephalites  
surystoma (Stehn)  
5560 - ? Inoceramus sp.  
5561 restos indeterminables  
5562 estéril  
5563 "  
5564 restos indeterminables  
5565 " "  
5566 " "  
5567 estéril  
5568 "  
5569 "  
5570 "  
5571 Macrocephalites aff. parvus Stehn,  
Inoceramus galoi Boehm Eurycephalites  
sp. aff. eurystoma(Stehn)  
5573 Neuqueniceras steinmanni (Stehn)  
5574 Estéril  
5575 "  
5576 "

- 4 -

- MUESTRA N° 5577 restos indeterminables  
5578 estéril  
5579 "  
5580 restos indeterminables  
5581 Eurycephalites eurystoma (Stehn)  
5582 "  
5583 "  
5584 "  
5585 restos indeterminables  
5586 " "  
5587 estéril  
5588 "  
5589 "  
5590 "  
5591 "

### BIBLIOGRAFIA

- BURCKHARDT, C. 1912 - Faunes jurassiques et cretaques de San Pedro del Gallo - Bol. México N° 29.
- LEANZA, A.F. 1947 - Descripción de la faúnala Kimmeridgiana de Neuquén, Informe preliminar N° 62-Dirección de Minas y Geología.
- STEIN, E. 1923 - Contribuciones para el conocimiento del Batoniense y Caloviano en la América del Sur Neuen jahrb. f. Mineralogie, etc. Beilage Band XLIX.
- STIPANICIC, P.N. 1969 - El avance en los conocimientos del jurásico argentino a partir de las esquemas de Greeber, Rev. Asoc. Geol. Arg. T. XXIV. N° 4.-